

## تشخیص بیماری:

- ✓ تست خون CBC-کشت خون
- ✓ آزمایش ادرار
- ✓ آزمایش و کشت نمونه از مایع مغزی - نخاعی
- ✓ عکس از قفسه سینه



## درمان بیماری:

نوزاد مبتلا یا حتی مشکوک به سپسیس حتما باید در بیمارستان بستری گردد و هر چه سریعتر آنتی بیوتیک مورد نیاز از طریق وریدی تزریق شود.

قطعا پزشکان برای عفونت نوزادان ، آنتی بیوتیک تراپی را حتی قبل از تشخیص قطعی شروع می کنند.

اگر علائم شوک ظاهر شود داروهای بالا برنده فشار خون را برای کمک به تنفس موثر نوزاد شروع می کنند.

## سپسیس ثانویه:

نوع دوم هم در هفته دوم بعد از زایمان حاصل می شود. ممکن است بوسیله تجهیزات آلوده بیمارستان و یا در معرض قرار دادن داروهایی که منجر به مقاومت آنتی بیوتیک می شوند.

## علائم و نشانه ها:

- ✚ بی اشتها و شیر نخوردن
- ✚ تب یا گاهی پایین آمدن غیر طبیعی دمای بدن
- ✚ درجه حرارت ۳۸ درجه سانتیگراد و بالاتر از آن
- ✚ تغییرات ضربان قلب تعداد زیاد یا تعداد کمتر از حالت طبیعی
- ✚ تنفس سریع یا سخت
- ✚ قطع تنفس
- ✚ زردی تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- ✚ تورم یا برجستگی فونتanel در نوزادان (ملاجها)
- ✚ هر گونه تغییر رفتار یا حرکاتی که شما را نگران کند.

## سپسیس نوزادان



سپسیس یک بیماری جدی است که معمولا توسط باکتری ایجاد می شود.

سپسیس می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا در صورتیکه درمان نشود بر روی کلیه ها ، مغز، قلب ، و گوش اثرات خطرناکی خواهد گذاشت . این بیماری در هر فرد و در هر سنی اتفاق می افتد ولی بیشتر در شیر خواران کم سن که سیستم ایمنی بدنشان به اندازه کافی رشد نکرده است و عفونت خیلی دیر از بدنشان دفع می شود و افرادی با سیستم ایمنی ضعیف مثل ایدز شایع تر است.

## سپسیس نوزادان دو نوع است:

### سپسیس اولیه:

در هفته اول زندگی بیشتر در ۲۴ ساعت اول زندگی تظاهر می کند عفونت اغلب از مادر گرفته می شود.

## دانشکده علوم پزشکی ساوه



### سپسیس (نوزادی)

### گروه آموزش سلامت



آدرس: خیابان مطهری-میدان مدرس-بلوار  
پرستار، مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور  
وشهید مدرس

تلفن: ۲۹-۲۶-۴۲۲۲۳۰۲۶-۰۸۶ داخلی ۳۴۰

## هشدارها:

وجود هر گونه عفونت در نوزادان یا شیر خواران در مقایسه با اطفال و بالغین بسیار خطرناک خواهد بود.

در این گروه سیستم ایمنی به خوبی تکامل نیافته است و هنوز توان مقابله با انواع عفونت ها را پیدا نکرده به همین علت است که گفته می شود باید درمان عفونت نوزادان در بیمارستان صورت گیرد.

شیرخواران زیر ۲ ماه بیشتر مستعد عفونت خون هستند زیرا سیستم ایمنی آنها هنوز بقدر کافی جهت دفع برخی از منابع عفونی تکامل نیافته است.

اگر درجه حرارت مقعدی شیر خوار ۳۸ درجه سانتی گراد باشد و علائمی شبیه خواب آلودگی ، کم اشتهايي و مشکل تنفسی داشته باشد، بهتر است به پزشک مراجعه نماید.

## نوزاد مستعد سپسیس:

نوزادانی که در بخش های ویژه نوزادان بستری می شوند، مستعد ابتلا به سپسیس هستند.

بیشترین علت این بیماری در نوزادان تازه متولد شده ورود باکتری ها در طی حاملگی ، زایمان و پس از زایمان به داخل بدن نوزاد می باشد.

بعضی از حاملگی ها پرخطرمانند: خونریزی، تب مادر، وجود عفونت در رحم یا جفت، پارگی زودرس کیسه آمنیوتیک ، زایمان سخت و طول کشیده ، باعث افزایش احتمال ابتلا نوزاد به سپسیس می شود.

